


Avertissements de l'ILE DE FRANCE agricoles



ISSN 0767 - 5542

Grandes cultures

BULLETIN N° 527 DU 27 FEVRIER 1990 - ENVOI N° 5

- COLZA : * Fiche couleur
* Charançon de la tige : à traiter dès la fin de la tempête.
* Commencer la surveillance méligèthes
- POIS : Pas encore de thrips .

COLZA

STADE : C2 à D2 (les boutons floraux sont parfois déjà dégagés des plus jeunes feuilles).

C2 - Entre-nœuds visibles. On voit un étranglement vert clair à la base des nouveaux pétioles : c'est la tige.



D1 - Boutons accolés encore cachés par les feuilles terminales.



D2 - Inflorescence principale dégagée. Boutons accolés. Inflorescences secondaires visibles.



CHARANCON DE LA TIGE :

* **Situation** : Des captures importantes ont été enregistrées dans les zones Sud-Est bordant l'ILE DE FRANCE en fin de semaine dernière.

* **Préconisation** : Si vous vous situez dans une zone régulièrement attaquée ou, si vous avez piégé de nombreux charançons dans la cuvette, un traitement est à réaliser dès la fin de la tempête.

Le colza reste sensible jusqu'à ce que la tige dépasse 20cm de haut. Passé ce stade, l'intervention devient inutile.

PUCERONS VERTS ET PUCERONS CENDRES :

* **Situation** : Quelques colonies ont été observées sur le secteur de Perthes en Gatinais (77).

* **Préconisation** : Ne pas faire d'intervention spécifique pour ce ravageur. Au moment du traitement méligèthes, choisir dans la fiche couleur ci-jointe, une spécialité efficace à la fois contre pucerons et méligèthes.

77



■ MELIGETHES :

* Situation : Les colzas les plus avancés, atteignent le stade sensible pour les attaques de méligèthes.
Nos observations de fin de semaine dernière montraient des infestations encore très rares : de 0,3 à 1 méligèthe pour 10 pieds.

* Préconisation : Surveillez cuvettes et boutons floraux .
Intervention nécessaire si 1 méligèthe est visible par plante jusqu'au stade boutons écartés, puis 2 ou 3 par plante jusque l'ouverture des premières fleurs.

P O I S

■ STADE

Germination pour les pois semés début février .

■ THRIPS :

* Situation : pas de thrips .

* Préconisation : Surveiller leur apparition .
Seuil de traitement = 1 thrips par plante au stade crosse.

Quand faut-il traiter ?

Ravageur	Observation des plantes	Piégeage "cuvette jaune"
Limace	Dès les premiers dégâts, du semis au stade B2	
Grosse altise adulte	3 pieds/10 avec morsures nutritionnelles, jusqu'au stade B2	20 à 30 captures cumulées après le stade B2
Grosse altise larve	2 plantes/3 attaquées	
Puceron cendré	— Automne, 1 plante/5 colonisée — De C1 à 3-4 semaines avant la récolte : 2 colonies/m ²	
Charançon du bourgeon terminal		Notez les premières captures : intervenez 10 à 15 jours après si le colza est au stade B3
Gros charançon de la tige		De C1 à T20, intervenir 8 à 10 jours après les premières captures
Meligèthe	— Stades boutons accolés à D1 : 1 insecte par inflorescence — Stades boutons séparés à E : 2 ou 3 insectes	Vous indique les premières arrivées Vous pouvez alors aller observer
Charançon des siliques	A partir des stades G2 G3 : 1 charançon pour 2 pl.	

Les produits de traitement

• Contre les limaces :

- appâts empoisonnés sous forme granulée, épandre régulièrement le soir (25 granulés par m²)
- matières actives : mercaptodiméthur (3 kg/ha - Mesurol antilimaces)
métaldéhyde (5 à 10 kg/ha selon les spécialités commerciales)
thiodicarbe (5 kg/ha - Skipper)

• Contre les insectes :

Au semis			De la levée à la fin du repos hivernal		Produits utilisables (1)		A partir de la reprise de végétation			
Mouche du chou	Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Grosse altise	Charançon du bourgeon terminal	Matières actives	Spécialités commerciales	Charançon de la tige	Meligèthe	Charançon des siliques	Puceron
	450 g ma/ha				Benfuracarbe	Oncol 5 G - Oncol S				
9 kg	9 kg	9 kg			Carbofuran	Nombreuses spécialités (2)				
9 kg	7,5 kg				Carbosulfan	Marshal Fort				
	12 kg	12 kg			Furathiocarbe	Deltanet				
	10 kg				Terbuphos	Counter plus				
	9 kg				Thiofanox	Dacamox 5 G - Dacamox 5 S				
9 kg	9 kg			9 kg	Carboforan - Isophenphos	Carma				
	18 kg				Phorate + Terbuphos	Dispell				
			0,15 l		Alphaméthrine	Fastac	0,15 l	0,15 l	0,2 l	
			0,07 l		Bifenthrine	Talstar	0,07 l	0, 1 l	0,1 l	
					Bromophos	Nexion 25 - Sovinexion 25 Nexion 40 - Nexion EC 40		2 l 1, 4 l	2 l	2 l
			0, 3 l	0,3 l	Cyfluthrine	Baythroid	0, 3 l	0, 2 l	0,2 l	
			0,25 l 25 g ma/ha		Cyperméthrine	Cymbush, Kafil super Nombreuses spécialités (2)	0,25 l	0,25 l 20 g ma/ha	0,25 l	
			0,2 l	0,2 l	Deltaméthrine	Décis Décis Flo - Biram Flo	0,2 l 7,5 g ma/ha	0,2 l 5 g ma/ha	0,2 l	
					Dialiphos	Torak		1,25 l	1,25 l	
			250 g ma/ha		Endosulfan	Nombreuses spécialités (2)	400 g ma/ha	250 g ma/ha	600 g ma/ha	
			0,6 l		Esfenvalérate	Sumi alfa		0,5 l	0,6 l	
			0,5 l		Fenvalérate	Sumicidin 10		0,4 l	0,4 l	
			0,2 l		Fluvalinate	Mavrik - Mavrik Flo		0,2 l		0,2 l
			0,1 l		Lambda-Cyhalothrine	Karate	0,15 l	0,1 l	0,1 l	
			200 g ma/ha		Lindane Lindane huileux	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
			1,5 l ou 1,5 kg		Malathion	Nombreuses spécialités (2)		1,5 l ou 1,5 kg		
			1,25 kg		Méthidathion	Ultracide 20 bouillie Ultracide 20 liquide	1,5 kg 1,5 l	1,25 kg 1,25 l		
			200 g ma/ha		Parathion Ethyl et Méthyl	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
			200 g ma/ha		Parathion huileux	Nombreuses spécialités (2)	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
					Phosalone	Zolone Flo - Azofène Flo Nombreuses spécialités (2)		2 l 1000 g ma/ha	2,5 l 1200 g ma/ha	1,2 l
					Pirimicarbe	Pirimor G - Aphox				0,5 kg
			0,065 l		Tralométhrine	Tracker 108 EC	0,09 l	0,065 l	0,065 l	
			0,75 l		Endosulfan + Parathion Ethyl	Drifène AP - Ekadrine PE	1,25 l	0,75 l		
					Endosulfan + Thiométon	Serk EC				1,5 l
			1 l 3 l		Lindane + Parathion Ethyl	Sopragam Typholine gamma 50	1,5 l 5 l	1 l 3 l		
			1,75 l		Lindane + Parathion Méthyl	Paralindex	2,5 l	1,75 l		2,5 l
			0,75 l 0,75 l		Phosalone + Parathion Méthyl	Fortène Taxylone	1,5 l	0,75 l 0,75 l		


(1) Doses en litre ou kilogramme de produit commercial par hectare.

(2) La dose de matière active par hectare mentionnée correspond à la dose de matière la plus fréquente. Avant toute utilisation, vérifier la dose de produit commercial autorisée sur l'étiquette.

Liste arrêtée au 01-02-90 - S.P.V. -

78

Cherchez-les au bon moment...



Dessins de A. GRAVAUD (Service de la Protection des Végétaux).


... avec la bonne méthode...

Le piégeage ou technique de la cuvette jaune

- **Mise en place des cuvettes** : dès le semis, ou au plus tard à la levée, dès les premiers réchauffements, les installer à 10 mètres de la bordure, du côté d'un ancien champ de colza; les remplir avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle.

Jusqu'au stade B2, la cuvette est enterrée, puis elle est placée à 25 cm de hauteur.

Attention ! Le fond de la cuvette doit suivre le niveau supérieur de la végétation.



- **Surveillance** : 2 fois par semaine et tous les jours après les premières captures.
- **Insectes capturés** : grosse altise, charançon du bourgeon terminal, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

L'observation des plantes

- **Observez 50 plantes** au hasard sur l'ensemble de la parcelle.
- **Insectes** : grosse altise (larve et adulte), puceron cendré du chou, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

... et comptez-les